



[www.esaunggul.ac.id](http://www.esaunggul.ac.id)

**Kesehatan Bayi/ Balita**  
**PERTEMUAN 7**  
**Ira Marti Ayu**  
**Kemas/ Fikes**


# KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan mengenai Kesehatan Bayi/  
Balita

# Learning Objective

- Definisi kematian bayi
- Determinan kematian bayi dan prinsip-prinsip penurunan AKB/AKBa
- Kaitan budaya dan gender dengan kesehatan bayi

# DEFINISI



konsepsi

lahir

4 minggu

52 minggu

28 (22)  
minggu  
kehamilan

1 minggu

abortus

lahir mati

**perinatal**


neonatal  
dini

**neonatal**

**post-neonatal**

**bayi (infant)**

telah lahir (lihat Gambar 4.10).




**GAMBAR 4.10** Bagan ukuran kematian di awal kehidupan.

## Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni

1. Angka Kematian Neonatal (AKN) → kematian yang terjadi pada bayi dari usia 0-28 hari
2. Angka Kematian Bayi (AKB) → anak yang usianya kurang dari satu tahun
3. Angka Kematian Balita (AKABA)

- Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi.
- Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup.
- Angka ini sama dengan AKN berdasarkan SDKI tahun 2007 dan hanya menurun 1 poin dibanding SDKI tahun 2002-2003 yaitu 20 per 1.000 kelahiran hidup
- Lahir mati: artinya tidak pernah hidup sehingga secara

### TREN ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA




Sumber: SDKI tahun 1991-2012, SUPAS tahun 2015



Berikut adalah angka yang dipakai untuk mengukur kematian bayi dan anak:

Kematian neonatum:	peluang untuk meninggal dalam bulan pertama setelah lahir
Kematian pos-neonatum:	peluang untuk meninggal setelah bulan pertama tetapi sebelum umur tepat satu tahun
Kematian bayi:	peluang untuk meninggal antara kelahiran dan sebelum mencapai umur tepat satu tahun
Kematian anak:	peluang untuk meninggal antara umur satu tahun dan sebelum tepat lima tahun
Kematian balita:	peluang untuk meninggal antara kelahiran dan sebelum umur tepat lima tahun
Kematian perinatal:	jumlah bayi lahir mati dan bayi yang meninggal sebelum berumur tepat satu minggu dibagi dengan jumlah kehamilan umur kandungan 7 bulan atau lebih

# Determinan kematian bayi



Gambar 1. Kerangka Teori Kelangsunagn Hidup Mosley and Chen (1984)

## **Faktor Ibu terdiri dari**

1. Umur,
2. Paritas
3. Jarak kelahiran

## **Faktor Pencemaran Lingkungan terdiri dari**

1. Udara,
2. Makanan/air/jari,
3. Kulit/zat penular kuman penyakit/tanah
4. Serangga pembawa penyakit (vectors)

## **Faktor Kekurangan Gizi terdiri dari**

1. Kalori,
2. Protein
3. Gizi-mikro (vitamin dan mineral)


## **Faktor kecelakaan terdiri dari**

1. Kecelakaan
2. Luka yang disengaja


## **Faktor Pengendalian Penyakit Perorangan terdiri dari**

1. Usaha-usah preventif perorangan,
2. Perawatan dokter


# Penyebab Kematian Neonatal di Indonesia Tahun 2001




## Proporsi Kematian Bayi Menurut Umur



# Penyebab Kematian Bayi, SKRT 2001



# Penyebab Kematian Balita SKRT 2001







## Prinsip-prinsip penurunan AKB/AKBa

- Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak.
- Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia delapan belas tahun.

# KERANGKA KONSEP MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN DAN KESAKITAN NEONATAL





# INTERVENSI YANKES NEONATAL

**Kehamilan dan  
Persalinan**

**1 – 7  
hari**

**8 – 28  
hari**

- **APD/APN**
- **PONED**
- **PONEK**
- **KIE Buku KIA Bumil Bulin**
- **Perawatan esensial BBL:**
  - **Persalinan aman dan bersih**
  - **Resusitasi**
  - **Menyusui dini**
  - **Pencegahan hipotermi**
  - **Pencegahan infeksi**

- **ASI eksklusif**
- **Menjaga bayi tetap hangat: *skin to skin contact***
- **Pencegahan infeksi**
- **Manajemen neonatus sakit umur (0-1 bulan) di luar RS**
- **MTBS: manajemen bayi muda sakit (7 hari – 2 bulan)**
- **Manajemen penyakit infeksi berat termasuk pada bayi muda**
- **Penggunaan Buku KIA**

# Kaitan budaya dan gender dengan kesehatan bayi

## **Kesehatan Ibu dan Anak Baru Lahir (*Safe Motherhood*)**

Hal-hal yang sering dianggap sebagai isu gender sebagai berikut:

- (i) Ketidakmampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan kesehatan dirinya, misalnya dalam menentukan kapan hamil, dimana akan melahirkan, dsb. Hal ini berhubungan dengan kedudukan perempuan yang lemah di keluarga dan masyarakat.
- (ii) Sikap dan perilaku keluarga yang cenderung mengutamakan laki-laki, contohnya dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari yang menempatkan bapak atau anak laki-laki pada posisi yang diutamakan daripada ibu dan anak perempuan. Hal ini sangat merugikan kesehatan perempuan, terutama bila sedang hamil.
- (iii) Tuntutan untuk tetap bekerja: pada daerah tertentu, seorang ibu hamil tetap dituntut untuk tetap bekerja keras seperti pada saat ibu tersebut tidak hamil.

# CONTINUUM OF CARE

